

130.00 mm

“晟德”

地高新醣劑
Cardiacin Elixir

50微克/毫升

50 μ g/ml "Center"

GMP
衛署藥製字第 047126 號
G-8638

主成份：每毫升(ml)含有
Digoxin0.05 mg

適應症：
心臟衰竭、心房撲動、心房纖維顫動、陣發性上室性心搏過速。

用法用量：本藥須由醫師處方使用
直接或和以開水吞服皆可，其用法如下，一日量分作3~4次服用。

年齡	初日量	維持量
1個月以上	2~4ml(0.1~0.2mg)	1ml(0.05mg)
3個月以上	4~6ml(0.2~0.3mg)	1.5~2ml(0.075~0.1mg)
12個月以上	6~8ml(0.3~0.4mg)	2ml(0.1mg)
2~3歲	8ml(0.4mg)	2~3ml(0.1~0.15mg)
4~6歲	10~12ml(0.5~0.6mg)	3~4ml(0.15~0.2mg)

副作用：

厭食、噁心、嘔吐，極少數病例可能發生精神紊亂、失語症、視覺障礙包括色幻覺。僅有特殊的病例會發生搔癢、蕁麻疹、斑狀皮疹等。

1.間有下列中毒症狀故應仔細觀察，如發生此項症狀時，應採取減量或停藥以及再從少量開始用藥等適當處置。

- (a)消化器：間有食慾不振、嘔吐、下痢等症狀。
- (b)循環器：間有不整脈、頻脈、高度徐脈等症狀。
- (c)眼：間有視覺異常(雖無光線但可見閃閃亮光，黃視，綠視，複視等)。
- (d)精神神經系：間有眩暈、頭痛、錯亂等症狀。

2.過敏症：

偶發疹、風疹、紫斑、浮腫等過敏症狀，如發生此等症狀時，應停藥。

3.其他：稀少發生女性型乳房。

注意事項：

- 1.使用digoxin的病患不可注射鈣。
- 2.若有冠狀動脈不全、電解質不平衡、腎臟或肝臟機能障礙時，請減低劑量。
- 3.使用本劑時應仔細觀察，並確認以往2~3週前有无服用過毛地黃劑或其它強心配醣體後慎重決定投與量。
- 4.下列患者不可使用

150.00 mm

- (1) 患有房室Block及竇房Block者。
 - (2) 毛地黃中毒及閉塞性心肌病患者（特發性肥大性大動脈瓣下狹窄等）。
5. 下列患者應慎重使用
急性心肌梗塞，心室性期外收縮，心膜炎，肺性心，甲狀腺機能亢進及降低症，低鉀血症。
（恐少量亦可能中毒，以及因效果不彰而過量以致中毒）。
6. 對於孕婦用藥：
因尚未建立對孕婦用藥之安全性，故應限於治療上之有益性大於可能發生之危險時始可用藥。
7. 對於兒童用藥：
因對於兒童之用藥易生副作用，應仔細觀察並慎重決定藥量。
8. 對於老年人用藥：
因對於老年人之用藥易生副作用，應仔細觀察並慎重決定藥量。

使用禁忌：

完全性房室阻滯及第二級房室阻滯，過度竇性心搏徐緩。

交互作用：

1. 影響精神的藥物以及擬交感神經藥等，可能使服用digoxin的病患發生心律不整的機率增加。
2. Thiazide利尿劑、腎上腺皮質類固醇及Amphotericin B可干擾電解質的平衡，助長digoxin毒性的出現。
3. 與下列藥物併用時，易生毛地黃中毒，故併用時，應仔細觀察，慎重給藥。
利尿劑、鈣劑、蛇根鹼系製劑、Atropine系製劑、 β 受容體遮斷劑，交感神經刺激，甲狀腺製劑。

中毒之處理：

立即停用本品，並洗胃，連續作心電圖監測。

賦形劑：Alcohol, Propylene Glycol, Methylparaben, Essence of Lime, Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous, Citric Acid Anhydrous, Edetate Disodium, Acesulfame Potassium, Greenapple Color, Water Purified

包裝：4~4000毫升塑膠瓶裝

儲存：

- (1) 本品應置於兒童不及之處。
- (2) 請密封並避光儲存於25°C以下，毋須冰存。

晟德大藥廠股份有限公司(公司)

CENTER LABORATORIES INC.

地址：臺北市南港區園區街3之2號7樓

晟德大藥廠股份有限公司新竹廠(製造廠)

廠址：新竹縣湖口鄉實踐路2號

公司電話：(02)2655-8680 圖文傳真：(02)2655-8380

工廠電話：(03)598-1829 圖文傳真：(03)598-1820

CTRA-049 20150728

14C11-D01