

“瑞安”

鎂 福

內服液

“Purzer”

Magvac

Oral Solution

瑞安大藥廠股份有限公司

PURZER PHARMACEUTICAL CO., LTD.

PIC/S GMP

衛署藥製字第033998號

GMP優良藥品G-2316號

本藥須由醫師處方使用

鎂福(Magvac)是含檸檬酸鎂(Magnesium Citrate)的內服液，而檸檬酸鎂是一種緩瀉劑。檸檬酸鎂主要作用在小腸，將小腸內的水分排入大腸，從而增加大腸之腸腔內壓及腸道的蠕動，因此可使腸道在3至6小時內排空。為了達到排空的效果，適量水分的補充可增加排空的速度及效果。在此一過程當中，約15~30%的鎂鹽會被吸收。鎂及鉀離子主要是經由腎臟排出體外，故新生兒、高齡患者或是腎功能不全者，會有滯留或積蓄的可能。

【成分】

每mL含：

Magnesium Carbonate..... 42.857 mg

Citric Acid Anhydrous..... 78.286 mg

賦形劑：Potassium Bicarbonate, Lemon Essence No.1, Benzoic Acid, Saccharin Sodium, Phosphoric Acid, Purified Water.

【適應症】

緩瀉劑。

【用法用量】

1.便秘疾患的急性治療

一次口服20~50mL即可，口服後並需充份補充水分，以達到排空的效果。一般建議睡前服用。

2.大腸檢查(X-Ray, Endoscopy)前胃腸道內容物之排空及腹部手術前胃腸道排空。

原則上，每次用量為一瓶(250 mL)，口服後並需充份補充水分，以達到排空的效果，用於X-Ray檢查或腹部手術之排空時，建議使用法如下：

《X-Ray檢查或手術前一天》

- 6:00 PM：晚餐僅食流汁即可，如：清湯、果凍，再加上250 mL的水分。
- 7:00 PM：口服鎂福內服液一瓶(250 mL)一次喝完及補充水分250 mL。
- 7:30 PM：再補充250 mL水分之後，每隔半小時補充250 mL水分到9:30 PM，共4次。
- 10:00 PM：以250 mL白開水口服 Bisacodyl 10 mg。
- 自10:00 PM以後至X-Ray檢查或手術前不得進食，白開水除外。

《第二天(X-Ray檢查或手術當天)》

- 6:00 AM：自肛門塞入Bisacodyl 10 mg栓劑一粒，必須強忍便意10~15分鐘方可。

【副作用】

過度的腸道蠕動會引起腹瀉或腹部不適，噁心、嘔吐、腹部絞痛、眩暈、衰弱感、心悸、出汗、及頭昏等現象。

【禁忌】

有嚴重腎機能不全者不得使用本藥。

【注意事項】

- 1.若有腹痛、噁心或嘔吐現象，請勿使用任何瀉藥，包括本藥。
- 2.口服本藥後，必須充份補充水份，以達到很好的排空效果。
- 3.若使用於胃腸道之排空，以利大腸檢查或腹部手術時，則於口服本藥後不得飲用或食用牛奶或牛乳類食品。
- 4.經常使用本藥可能會造成習慣性依賴。
- 5.請將本藥放置在孩童無法取得的地方。

【儲存條件】

室溫貯存。

【包裝種類】

1000毫升以下瓶裝。

瑞安大藥廠股份有限公司

地 址：台北市松山區光復南路1號12樓之2

製 造 廠：瑞安大藥廠股份有限公司觀音廠

廠 址：桃園市觀音區草漯里大同一路26號

服務電話：(02)2766-0887

C0102904