



鼻舒液

PSEU SOLUTION "KOJAR"

衛署藥製字 第 039956 號

須由醫師處方使用

版本日期 2025-09-10

1 性狀

1.1 有效成分及含量

每 mL 含有：

Pseudoephedrine Hydrochloride.....6mg

Triprolidine Hydrochloride.....0.25mg

1.2 賦形劑

Methylparaben、Propylparaben、Sucrose、Propylene Glycol、Alanine DL-、
Saccharin Soluble、Pineapple Flavor、Tartrazine Yellow、Sorbitol、Sucralose、
Menthol、Glycerin、Citric Acid、Purified Water

1.3 劑型

內服液劑

1.4 藥品外觀

淡黃色之澄明溶液

2 適應症

感冒、枯草熱、過敏性及血管舒縮性鼻炎所引起之上呼吸道粘膜充血。

3 用法及用量

3.1 用法用量

成人及 12 歲以上之兒童，每次 10mL，每天 3 次，6~12 歲每次 5 mL。

2~5 歲每次 2.5 mL。6 個月~2 歲以下，每次 1.25 mL。

4 禁忌

嚴重高血壓(收縮壓 $\geq 180\text{mmHg}$ 和/或舒張壓 $\geq 120\text{mmHg}$)、末期腎病或在進行透析之病人。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

5.1.1 使用本劑期間不宜使用 MAO 抑制劑、安神劑、催眠劑及其它中樞抑制劑。

5.1.2 國內外曾有 2 歲以下幼兒使用第一代抗組織胺口服劑型藥品後導致嚴重傷害(如中樞神經功能障礙等)之案例報告。目前並無明確證據顯示兒童使用第一代抗組織胺藥品之效益，本品應謹慎使用於 6 歲以下兒童族群。



5.1.3 可逆性後腦病變症候群 (posterior reversible encephalopathy syndrome, PRES) 和可逆性腦血管收縮症候群 (reversible cerebral vasoconstriction syndrome, RCVS)：

曾有使用含 pseudoephedrine 成分藥品後發生 PRES 和 RCVS 的案例報告。此風險會因病人具嚴重或未控制 (未受治療或頑固性) 高血壓、嚴重急/慢性腎病或腎衰竭而增加。使用含 pseudoephedrine 藥品時若發生以下症狀：突發嚴重頭痛或雷擊性頭痛、噁心、嘔吐、混亂、癲癇和/或視力障礙，應立即停藥並尋求醫療協助。大部分發生 PRES 或 RCVS 的案例在停藥並接受適當治療後會痊癒。

5.3 操作機械能力

本品可能引起嗜眠服用本品期宜避免開車或操作機械。

5.5 其他注意事項

本品僅限短期使用，應避免長期或過量使用。

6 特殊族群注意事項

6.1 懷孕

懷孕期之安全性尚不明確，因此懷孕婦女除非必要，避免使用本品。

6.2 哺乳

授乳之婦女則須考慮停用本品或停止授乳。

6.4 小兒

未滿12歲有腎功能不全或高血壓之兒童患者，須經醫師評估後謹慎使用。

7 交互作用

目前尚無資訊。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

目前尚無資訊。

9 過量

服用過量時，可用洗胃和一般的支持療法來處理。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

目前尚無資訊。


10.2 藥效藥理特性

目前尚無資訊。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性



目前尚無資訊。

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

60 ~ 4000 毫升塑膠瓶裝、玻璃瓶裝及 30 毫升塑膠瓶裝、玻璃瓶裝。

13.2 效期

如外包裝所示。

13.3 儲存條件

於 25°C 以下、避光儲存。

13.4 儲存注意事項

本藥應置於小兒伸手不及處。

製造廠

國嘉製藥工業股份有限公司幼獅三
廠 臺中市大甲區日南里工十路2號

藥商

國嘉製藥工業股份有限公司幼獅三
廠 臺中市大甲區日南里工十路2號