


市售藥品得僅放置經審查核定之中文仿單。但如市售藥品同時放置中、外文仿單者，外文仿單內容須與核定本之中文仿單內容相符，廠商得依核定之中文仿單自行修正其外文仿單內容。

外盒、仿單、標籤粘貼表

產品名稱	蓋抹減顆粒劑 "Norit" Carbomix Granules for Suspension	申請廠商	科懋生物科技股份有限公司
衛生署給證號碼	衛署藥輸字第 021549 號		



蓋抹減顆粒劑

NORIT CARBOMIX Granules for Suspension

成份

蓋抹減顆粒劑每瓶含 50 公克活性碳或每袋鋁箔包含 5 公克活性碳之主成份外，尚含有檸檬酸、甘油及阿拉伯膠等賦形劑。

適應症

緊急治療藥物或化學品中毒之病人。

用法·用量

指示用藥。

瓶裝蓋抹減顆粒劑，加入蒸餾水到標籤上之紅色線（50 公克瓶裝約加 400 毫升）後徹底搖勻。5 公克鋁箔袋裝之蓋抹減顆粒劑則輕輕投入玻璃杯中，加水約 25 至 50 毫升，並徹底混合均勻。均勻混合之懸浮液，可廣泛用以吸附引起口服中毒之各種毒性物質。

成人及 12 歲以上兒童之使用劑量及方法：

急性中毒時，儘快使用 50-100 公克之活性碳（1-2 瓶）懸浮液。嚴重中毒時，服用初劑量後，每 4 至 6 小時應再服用 20 公克活性碳（20 公克活性碳約為瓶裝 160 毫升之懸浮液或 4 包袋裝製成 160 毫升之懸浮液），連續數天。對昏迷不醒的患者，在醫師或護士監督下，可經由鼻胃管給予懸浮液，瓶裝包裝附有接管供使用。

蓋抹減顆粒劑可在嘔吐或洗胃後使用。

12 歲以下兒童之使用劑量及方法：

活性碳用在小孩之推薦劑量是每公斤體重給予 1 公克之活性碳。急性中毒時，依小孩之體重和中毒之程度給予 2 至 10 袋（每袋 5 公克）；幼兒初劑量給予 2 至 4 袋，數分鐘後根據醫師指示，可重複給藥；較大的小孩則儘量給予大劑量（6 至 10 袋）。治療腹瀉，只要小劑量即可。

禁忌

患者必須使用口服藥劑或口服特殊之解毒劑時，不可使用活性碳。

副作用、警語和注意事項

發生中毒時先使用蓋抹減顆粒劑後，立即送醫急救。服用蓋抹減顆粒劑會造成黑便。由於其對腐蝕性物質引起之中毒無效，因此，如確定是由腐蝕性物質引起之中毒，應避免使用本品。蓋抹減對氰化物、鐵鹽、鋰鹽、甲醇、乙醇和乙二醇吸附力差。這些都併用特殊之解毒劑：

毒物	特殊解毒劑
氰化物	亞硝酸鈉
鐵鹽	Deferoxamine
鋰鹽	Calcium polystyrene sulphate
甲醇	乙醇
乙二醇	乙醇

對許多中毒病例常必須併用蓋抹減顆粒劑和其特殊解毒劑，以達到確實解毒效果（如嚴重 paracetamol 中毒，須併用 N-acetyl cysteine 效果更佳）。

一般患者對蓋抹減顆粒劑之接受性很好，只有少數患者可能會有便秘或腹瀉現象，如發生便秘可以 Liquid Paraffin, Lactulose 或其他緩瀉劑治療。

懷孕及哺乳：本品對胎兒或幼兒不會造成任何影響。

交互作用

蓋抹減顆粒劑通常會降低口服藥劑之效果，如降壓劑、類風濕關節炎治療劑等。同時服用避孕藥時，必須請教醫師。

包裝

1000 公克以下塑膠瓶裝及鋁箔袋裝。

【製造廠】 Cabot Norit Nederland B.V. (Pharmaceuticals Department)

【廠址】 Mr. Ovingkanaal O.Z. 3, 7891 EV Klazienaveen, The Netherlands.

【藥商】 科懋生物科技股份有限公司

【地址】 台北市南港區 (115) 園區街 3 號 14 樓之 6

【電話】 (02)2655-7568