

# 【仿單】

“福元”美克旅鎮錠 25 毫克

**Meclizine HCl** Tablets 25mg “F.Y.”

醫師藥師藥劑生指示藥品 內衛藥製字第 004781 號

【成分】每錠中含有：

Meclizine Hydrochloride ..... 25.0 mg

賦形劑：Lactose、Potato Starch、Cellulose Microcrystalline、Magnesium Stearate、Hydroxypropyl Cellulose、Talc、Silicon Dioxide Colloidal、Alcohol 95%。

### 【適應症】

預防或緩解動暈症(暈車、暈船、暈機)引起之頭暈、噁心、嘔吐、頭痛等症狀。

### 【用法用量】

預防暈車、暈船、暈機時，於搭乘前 30 ~ 60 分鐘服用之。成人 1 次 2 錠，一天服用一次，12 歲以上適用成人劑量；12 歲以下之兒童，使用前請洽醫師診治，不宜自行使用。

### 【注意事項】

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦、可能懷孕婦女及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
5. 不得併服含酒精飲料。
6. 服用本藥若有不了解之處，請洽詢醫師藥師藥劑生。

### 【警語】

1. 服用本藥後，可能引起思睡、倦怠感、口乾，偶有視覺上之困擾，偶見興奮反應(以幼兒及老年人較常見)，老年人應小心使用本藥，如症狀持續加強，宜停藥就醫。
2. 除非醫師處方，嚴重之代謝性肝腎病患者不得服用。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
  - (1) 12 歲以下不建議自行使用。
  - (2) 曾經因本藥物引起過敏症狀者不得使用。
4. 下列病患使用鎮量藥前，應詢問醫師藥師藥劑生：
  - (1) 接受醫師治療並服用藥物者。
  - (2) 大於 65 歲以上者。
  - (3) 本人或家族具過敏體質者。
5. 除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經有心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺功能亢進、腎臟病者不得服用。
6. 除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用鎮靜劑、安眠劑及其他含有抗組織胺成分之內服製劑(如其他鎮量藥、綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鼻炎藥物或抗過敏藥等)。
7. 如有呼吸之毛病或慢性支氣管炎、青光眼、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難或因前列腺腫大引起之排尿困難，請勿服用此藥。
8. 服用本藥後，可能引起嗜睡現象，勿駕車或操作危險器械。
9. 如發生皮膚發疹、發紅、癢疹、頭痛、臉紅、心悸、排尿困難、暈眩、浮動、不安定感、口乾、便秘及下痢等症狀時，請停止服用，並持藥品包裝及說明書，詢問醫師藥師藥劑生。

【儲存條件】請儲存於密閉容器、25°C 以下避光處所，且於期限內使用。

【包裝】1000 錠以下塑膠瓶裝、PTP 鋁箔盒裝。

LT-T069

福元化學製藥股份有限公司

新北市瑞芳區大寮路 95-1 號