



永豐藥品

4-129-37-5(9)

鈣克康<sup>®</sup> 靜脈注射液  
**CALGLON<sup>®</sup> IV. Injection 10%**  
(Calcium gluconate)

本品之作用與其他鈣劑相同，惟並無氯化鈣注射液行靜脈注射時若漏液於靜脈外，易引起炎症、浸潤、硬結、壞疽等之副作用。

**成 分** 每mL含有：  
Calcium gluconate.....100.0mg  
【賦形劑】 Calcium saccharate、Water for injection

**適 應 症** 骨形成不全、出血、血清病、氣管支氣管氣喘痙攣性因素、皮膚疾患。

**用法用量** 靜脈注射  
成人—每次10mL，每日或隔日注射一次。  
小孩—每次2~5mL。  
對鈣劑過敏、發熱或衰弱之患者，應從5mL始用。  
本藥限由醫師使用。

**儲存條件** 室溫保存(30°C以下)。

**注意事項** 本品與酒精混合會析出沉澱，故注射器如使用酒精消毒時，須俟酒精揮發完全後使用。  
本品注射時，須保持澄清狀態，方可使用。  
本品遇有結晶析出時，應先溫熱使之溶解澄清後，方可使用。

**包 裝** 玻璃小瓶 10mL、50mL、100mL/100支以下盒裝。  
玻璃安瓿 10mL/100支以下盒裝。  
塑膠安瓿 10mL/100支以下盒裝。  
塑膠瓶(LDPE) 50mL、100mL、200mL/100支以下盒裝。  
衛署藥製字第058006號



永豐化學工業股份有限公司  
製造廠：新 莊 工 廠  
**Y F CHEMICAL CORP.**  
新北市新莊區新樹路292號