

藥品衛教單

Aprovel

安普諾維膜衣錠



耕莘醫院地址：新北市新店區中正路362號

安康院區地址：新北市新店區車子路15號

藥物諮詢專線

總院：02-22193391 分機15144

安康：02-22123066 分機51360

商品名	Aprovel Tablet - 300 mg
學名	Irbesartan
中文名	安普諾維膜衣錠
藥品外觀	白色橢圓形錠劑, 標記: 心型圖案/2873
治療用途	此藥品可用於治療高血壓, 降低血管阻力, 達到降低血壓的功效。也可用於伴有第二型糖尿病患者的高血壓及糖尿病腎病變
如何服用藥品	可於飯前或飯後服用, 請依醫囑每日固定時間服藥。若有胃腸不適, 可與食物或牛奶併服; 可依需要剝半或磨粉服用。
可能的副作用	頭痛、低血壓、疲倦感、暈眩、噁心嘔吐、肌肉疼痛、高血鉀, 若出現嚴重不適, 請立即就醫。
忘記服藥時該怎麼辦	
若於同日內想起, 可盡快補服; 若已接近下次服藥時間, 請跳過該次, 不可一次服用兩倍劑量。	
藥品如何保存	
室溫下儲存, 請放置在陰涼、乾燥處, 並置於孩童無法取得之處。完整未拆封的藥品請參考包裝上的有效期限; 藥品拆封後, 請於六個月內使用完畢。	
注意事項	
<ul style="list-style-type: none">✓ 用藥期間請定期追蹤血壓、腎功能與血鉀濃度。✓ 使用本藥期間若大量流汗、嘔吐、腹瀉, 易造成血壓下降, 請適時補充水分並告知醫師。✓ 服用鋰、鉀補充劑、鹽替代物、利尿劑、疼痛或關節炎藥物者, 須先與醫師討論; 飲食請注意避免大量攝取香蕉、楊桃等高鉀食品✓ 不建議用於孕婦婦女, 如已經懷孕、有懷孕計畫或準備哺乳, 請務必告知醫師。✓ 若出現皮疹、嘴唇腫脹、呼吸困難等過敏反應, 請立即就醫。	