

完 疲

痠痛凝膠

10公絲/公克 (匹洛西卡)

TORICAM GEL

10mg/g(piroxicam)



本劑為非類固醇抗炎劑，同時具有止痛及解熱作用，不論發炎原因為何本劑均有效，據推論可能是經由對發炎媒介物前列腺的合成抑制而產生上述效果，臨床研究證實本劑對外傷運動傷害或手術後的疼痛都有效果。

【成分】每公克含：

Piroxicam.....10mg

本產品每公克內含非活性成分：Propylene Glycol、Carboxyvinyl Polymer、Hydroxypropyl Cellulose、Benzyl Alcohol、Menthol、Diisopropanolamine、Ethanol、Purified Water。

【適應症】

類風濕性關節炎、骨關節炎（關節痛、退化性關節炎）僵直性脊椎炎、急性肌肉骨骼損傷和急性痛風、肌肉痛、外傷後之腫脹及疼痛。

【用法・用量】

1.取本劑適量、塗擦於患部，一日數次。

（取適量凝膠，以手輕輕地將凝膠塗擦於患部及其周圍處直至凝膠快乾的時候，再取適量的凝膠繼續塗擦，依前述方法重覆塗擦凝膠2~3次後，俟凝膠自然乾爽時，即完成一次擦藥的動作。一天擦藥2或3次。）

2.如患部可以熱敷時，先將患部熱敷以後再擦藥按摩，效果更佳。

【包裝】

1000公克以下鋁管裝

本藥須由醫師處方使用
衛署藥製字第039429號
GMP優良藥品G-5066號



木一工一株式会社商標授權
五洲製藥股份有限公司
通過PIC/S GMP優良藥廠
桃園市新屋區赤欄里17-1號

I31
v3.00