

天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 藥品衛教單

Qtern Tablet - 10/ 5 mg★

藥物學名：Saxagliptin, Dapagliflozin (控糖穩膜衣錠)

藥品外觀：淺棕色至棕色的雙凸圓形膜衣錠，標記：5/10、另一面印有1122



掃描看官網資訊

藥品資訊 (Drug Facts)

更新日期：2026/01/08

用途 (Uses)

用於改善18歲以上成人第二型糖尿病患者的血糖控制，適合先前使用其他降糖藥物控制效果不佳的病人。

使用方法 (Directions)

每天早晨固定時間服用，每日一次，飯前或飯後均可，整粒以開水吞服，不可壓碎、切半或咀嚼。

忘記服藥時 (Missed dose)：

若當天忘記服藥，請儘快補服；如接近下次服藥時間，請略過該劑量，不可同時服用雙倍劑量。

注意事項 (Warnings)

- 服藥期間若出現噁心、嘔吐、腹痛或呼吸困難，請立即告知醫師。
- 若同時使用胰島素或降血糖藥物，可能增加低血糖的風險，須與醫師確認劑量調整。
- 若有泌尿道感染症狀（例如疼痛、發燒、尿液異常）或是生殖器或會陰部疼痛、紅腫，請立即就醫。
- 若服用期間發現皮膚起水泡或糜爛，須立即就醫檢查。
- 請維持良好水分攝取，避免脫水，特別是在發燒、嘔吐或腹瀉時。
- 遵醫囑定期檢查血糖、酮體與腎功能。

副作用 (Side Effects)

可能會發生上呼吸道感染、泌尿道感染、頭痛、腹瀉、背痛、關節痛、排尿次數增加或生殖器感染等症狀。

保存 (Storage)

室溫下 (30°C) 儲存。若藥品未拆封，請參考包裝上的保存期限；拆封後的藥品最多可保存6個月，請放置在陰涼、乾燥處。

