

請由此處剪開



↑ 開封後請速將拉鍊密閉



外用藥

先生
女士

用量 1 日 回 日 分

年 月 日

使用時請詳閱背面說明

請由此處剪開

開封後請速將拉鍊密閉



Fubifen PAP "FM"

"漁人" 氟比洛芬貼布

本品為一水性貼布清涼透氣、撕貼容易，能滲入皮膚組織及關節患部，可促進血液循環，鎮痛消腫，藥效溫和。對於關節炎、肩、腰、腿部肌肉酸痛及運動傷害之發炎紅腫，均有良好療效。

成 分 每片10gm膏體(10cm × 14cm不含不織布，離形紙)
含：Flurbiprofen 40mg

賦形劑 Purified Water, Gelatin, Tartaric Acid, Alcohol, L-Menthol, Polysorbate 80, Sorbitan Sesquioleate, Capsicum Oil, Glycerin, Kaolin, Titanium Oxide, Methyl Paraben, Sodium Polyacrylate, Sodium Carboxymethylcellulose, Sorbitol Solution 70%, Polyacrylic acid, Nikasol TS-620

適應症

變形性關節症、肩關節周圍炎、肌腱腱鞘炎、腱周圍炎、上腕骨上髁炎、筋肉痛、外傷後之腫脹，疼痛等諸症狀的鎮痛、消炎。

用法用量

- 通常一日一次貼於患部，慢性病患者或重症者，一日換貼2~3次，可切割成適當大小，剝去表面薄紙，貼於患部。
- 流汗時，請先將患部擦乾再予貼上。
- 於關節等易脫落之部位，可用護膠或伸縮繩帶固定。

本藥須由醫師處方使用

注意事項

- 請勿使用於下列部位：
 - 眼睛四周，粘膜處。
 - 漢疹、癩疹，傷口等部位。
- 對藥物化妝品等有過敏症狀者(例如發疹、潮紅、搔癢、癩疹等)，使用前需請教醫師或藥師。
- 兒童須在保護者指導監督下，才可使用。
- 本品應置於兒童不易拿到之處。
- 避免日光直射，貯存於乾燥陰涼處。
- 使用後將開封線條壓平或將開封口壓折，以防空氣進入，確保品質。
- 2歲以下兒童之使用須詢問醫師或藥師。

4片裝

製造批號：

保存期限：

製造廠：德山製藥股份有限公司
地 址：嘉義縣民雄工業區中山路38號
服務專線：0800-775589
包 裝：10g (10cm×14cm) / 片
衛署藥製字第043180號
委託廠：漁人製藥股份有限公司
地 址：高雄市左營區民族一路707號



4712284501543