

130mm

綜合電解質注射液

“大塚”

台大5號 注射液

Taita No.5 Injection “Otsuka”

衛署藥製字第 022682 號

本藥限由醫師使用

台大5號注射液，係根據台大醫學院附設醫院小兒科之處方，製成之產品。為含有葡萄糖、氯化鈉、醋酸鈉、醋酸鉀、氯化鎂、磷酸二氫鉀之綜合電解質及熱能補充維持液。

〔組成〕：W/V %

成分	mg/mL	成分	mg/mL
NaCl	0.82	MgCl ₂ · 6H ₂ O	0.30
CH ₃ COOK	0.59	KH ₂ PO ₄	1.63
CH ₃ COONa	1.80	C ₆ H ₁₂ O ₆	100

賦型劑：Water for injection

〔電解質量〕：

電解質 mEq/L					Glucose g/L	Osmolality mOsm/L	pH
Na	K	Mg	Cl	Acetate Phosphate m mole/L			
36	18	3	17	28	100	669	4.0~7.5

〔適應症〕：

手術前後及未能進食病人之水份、電解質、熱能補充、維持液。

〔用法用量〕：

通常一次400~1200mL，末梢或中央靜脈注射，小孩依體重定之。

〔注意事項〕：

(1) 取用時：

- ① 運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動，若發現有上述情形時，請勿使用。
- ② 本品為無色~淡黃色澄明液，若藥液有不澄清、變色、異物或其他異常現象時，請勿使用。

(2) 輸液套選用及插入法：

- ① 請依輸液套使用方法正確使用。
- ② 請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割(Coring)產生碎片。
- ③ 使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

〔包裝〕：

250、400、500mL塑膠瓶裝。

〔貯存法〕：

室溫保存。

〔有效期限〕：

請見外箱或標籤上之標示。



台灣大塚製藥股份有限公司中壢工廠
桃園市中壢區吉林路15號

IP1911

260mm