

130.00 mm

“晟德” 沙法克寧懸液劑

Sulfacotrim Suspension

"Center"

GMP
衛署藥製字第 044321 號
G-7474

主成份:每毫升(ml)含有

Trimethoprim 8.0 mg

Sulfamethoxazole 40.0 mg

適應症:

由革蘭氏陽性菌及陰性菌所引起之呼吸道、胃腸道及尿道感染。

用法用量: 本藥須由醫師處方使用

成人: 每日二次, 每次20毫升, 早晚餐後各服一次, 若連續使用十四天以上, 可改為每日二次, 每次10毫升。重症者可用高劑量, 每日二次, 每次30毫升。

兒童: 六週至五個月, 每日二次, 每次2.5毫升。六個月至五歲, 每日二次, 每次5毫升。六歲至十二歲, 每日二次, 每次10毫升。

特性:

- 1.本劑之殺菌原理為兩種成分, 同時個別阻斷病菌在合成葉酸時所需之兩種酵素, 使病菌分裂生殖之原料DNA及RNA無法形成而達殺菌之功效。
- 2.兩種藥物配合後產生新的殺菌效能, 由在單獨使用時之制菌性及有耐藥性轉變成殺菌性及無耐藥性。
- 3.經臨床證實, 殺菌範圍較Ampicillin, Tetracycline, Penicillin G, Chloramphenicol, Phenethicilline等抗生素為廣, 除糞便鏈球菌及綠膿桿菌作用較未顯著外, 其他治病效力皆很強。且對抗生素有抗藥性者, 使用本劑仍然有完滿的效果。
- 4.吸收迅速, 口服1~4小時即能達最高血中濃度, 每12小時服用一劑量就能維持一定之血中濃度。
- 5.易分佈於各臟器, 向腦及脊髓液之移行率高。
- 6.24小時內, Trimethoprim約有50%, Sulfamethoxazole約有50~70%排泄於尿中, 故無過度積蓄傾向, 且無需多次服藥。

150.00 mm

作 用：

對於大腸菌、變形菌、痢疾桿菌、腸炎菌、傷寒菌、霍亂弧菌、流行性感冒及百日咳桿菌、腦炎雙球菌、破傷風桿菌、葡萄球菌、鏈球菌及其他磺胺劑有感受性的病菌所引起之下列各種傳染病均為有效：

- 1.呼吸系統傳染病：急性氣管炎、支氣管炎、肺炎、扁桃腺炎、咽喉炎及鼻竇炎。
- 2.生殖泌尿系統傳染病：急性膀胱炎、膀胱腎盂炎、腎盂腎炎、尿道炎及淋病。
- 3.腸胃系統傳染病：細菌性腸炎、傷寒及副傷寒。
- 4.皮膚傳染病：膿性皮炎、癬瘡、膿瘡及傷口傳染。
- 5.其他傳染病：敗血病及各種細菌性之傳染。

注意事項：

- 1.對於有過敏性反應，孕婦支氣管喘息，肝腎機能不良及有血性惡病質之病患須留意使用。
- 2.接受本劑治療時須經常作血球計數，若有異狀不能繼續使用。
- 3.剛出生嬰孩禁止服用。
- 4.老年病患不能以利尿劑Thiazides與本劑一起服用。
- 5.本藥須由醫師處方使用。
- 6.服用前請先振盪均勻。

副 作 用：

體質特異者有噁心、嘔吐、瀉肚及過敏反應，其它副作用極少。

賦 形 劑：Sucrose, Alcohol, Edetate Disodium, Methylparaben, Microcrystalline Cellulose, Carboxymethylcellulose Sodium, Xanthan Gum, Saccharin Sodium, Polysorbate 60, Simethicone Emulsion 30%, D-Sorbitol Solution (70%), Glycerin, Tartrazine, Pineapple Flavor, Water Purified

包 裝：80~1000毫升塑膠瓶裝

儲 存：

- (1)本品應置於兒童不及之處。
- (2)請密封儲存於25°C以下，毋須冰存並避免陽光直射。

晟德大藥廠股份有限公司(公司)

CENTER LABORATORIES INC.

地 址：臺北市南港區園區街3之2號7樓

晟德大藥廠股份有限公司新竹廠(製造廠)

廠 址：新竹縣湖口鄉實踐路2號

公司電話：(02)2655-8680 圖文傳真：(02)2655-8380

工廠電話：(03)598-1829 圖文傳真：(03)598-1820

CTRA-037 20150728

14S14-D01