


# "信東" 賜福力欣 膠囊

## Cephalexin Capsules

Cephalexin是由頭孢子菌素(Cephalosporin C)衍生而來之半合成抗生素，其構造為8元之 $\beta$ -lactam-dihydrothiazine Ring為骨架，異於Penicillin 7元之 $\beta$ -lactam-thiazolidine Ring構造式如下：



1

Cephalexin為單結晶水之白色晶形粉末，其作用機序類似Penicillin之抑制細菌細胞壁之Mucopeptide合成Penicillinase不影響其作用，是廣效性之抗生素，不受酸之作用，口服易吸收血中濃度(口服250 mg)可達4.5~6.8mcg/ml分佈很廣，如體液、肺、脾、肝、胰臟、心臟、胃壁、腹膜、盲腸、膽囊、陰道、腎臟等。口服後約90%不改變分子型式由尿中排出體外。對Gram(+)、Gram(-)菌，如化膿性鏈球菌、肺炎雙球菌、白喉桿菌、草綠色鏈球菌、大腸菌、肺炎克雷白氏菌、奇異變形桿菌、流行性感嗜嗜血桿菌、淋病雙球菌、腦膜炎雙球菌、沙門氏族菌及志賀氏菌屬等皆有效。

2

**【成分】**  
主成分：Each capsule contains :  
Cephalexin..... 500mg (Potency)  
賦形劑：Magnesium Stearate、Capsule Shell (含Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Brilliant Blue FCF、Titanium Dioxide、Tartrazine)。

**【適應症】**  
葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

**【作用】**  
有感受性細菌所引起之泌尿生殖道、呼吸道、柔組織及皮膚等感染症。如急性慢性腎盂炎、前列腺炎、咽喉炎、中耳炎、外耳炎、

3

扁桃腺炎、鼻竇炎、肺炎、支氣管炎、丹毒、蜂窩組織炎膿腫、淋巴腺炎、膿性皮炎、青黴素不適用之淋病、骨、關節炎、骨髓炎、風濕性心臟病。

**【注意】**  
服用本劑後，可能有假性糖尿反應，可用Clinistix試劑則不生此現象，青黴素過敏患者Cephalexin有好之耐受性，應注意其交互過敏反應，腎機能降低時應減量服用，孕婦應謹慎使用，避光貯存30℃以下。

**【用法·用量】**  
口服：成人一次250~500mg，每6小時一次。  
小孩一天25~50mg/kg，分四次使用。  
本藥須由醫師處方使用。

4

**【包裝】**  
1000粒以下瓶(盒)裝。

衛署藥製字第015660號



信東生技股份有限公司 觀音廠  
桃園市觀音區國建一路1號

5

# "信東" 賜福力欣 膠囊

1000 粒

## Cephalexin CAPSULES

**成分：**  
每粒中含有Cephalexin.....500mg (力價)

**適應症：**  
葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

**注意事項：**  
請詳閱說明書。

**用法·用量：**  
請詳閱說明書。  
本藥須由醫師處方使用。  
衛署藥製字第 015660 號

信東藥品



信東生技股份有限公司 觀音廠  
桃園市觀音區國建一路1號 54031329

內有說明書請由此打開

# "信東" 賜福力欣 膠囊

1000 粒

## Cephalexin CAPSULES

信東藥品



信東生技股份有限公司 觀音廠  
桃園市觀音區國建一路1號