



“杏輝”

PIC/S GMP藥品

得康錠(的剎美剎松)

DECONE Tablets (Dexamethasone) “Sinphar”

— 腎上腺皮質類固醇製劑 —

Corticosteroids

Dexamethasone於1858年最早在美國發明由合成法製造問世。其化學構造如下：
16- α -methyl-9 α -fluoro-11 β ,17 α ,21-trihydroxy- $\Delta^{1,4}$ -pregna-diene-3,20-dione.(16- α -methyl-9 α -fluoro-prednisolone)

成分：每錠中含有：

Dexamethasone.....0.5mg

賦形劑：Lactose、Erythrosine aluminum lake、Corn starch、Hydroxypropylcellulose-SL、Talc、Magnesium stearate、Water purified

作用：本劑是人工副腎皮質荷爾蒙，是為強力的抗炎症Corticoid的一種，其作用力比任何他種天然或人工副腎皮質荷爾蒙都強。試驗結果證明對白鼠肉芽形成的阻止作用比Hydrocortisone要強190倍。臨床的力價對抗Rheumatic的作用比Prednisolone強5~10倍，比Hydrocortisone強30倍，本劑抗炎症作用強但糖代謝作用即較弱，對肝臟的Glycogen沈積作用比Hydrocortisone強17倍。

適應症：氣喘、蕁麻疹、灼傷、風濕性關節炎、支氣管氣喘、皮膚炎。

用法用量：此藥用量依照疾病的種類、症狀、個人體質等差異，應有所調整。如風濕性關節炎、支氣管氣喘這類不嚴重的慢性疾患，使用量可為每日1.5mg~3mg(3~6粒)，然後每3~4日遞減0.25mg，普通每日量以維持0.5~1.5mg(1~3粒)為宜。

嚴重支氣管氣喘症者每日服用2~4mg。使用本藥要中止時必須漸漸減量以至完全停止。於飯後或就寢前，分為3~4次服用。

注意事項：本劑中會有Dexamethasone服用時請注意下列事項：

1. 急性慢性感染症，使用時請同時併用適當的化學療法劑或抗生素藥品以治療感染疾病。
2. 對消化管障害如胃腸潰瘍務請特別注意。
3. 因主要副作用引起浮腫，血壓上升，尤以腎臟疾患及高血壓患者應注意。
4. 糖尿病患者使用時有增加 Insulin 藥量的必要者請注意。
5. 對於有精神病因素者多加注意。
6. 服用本劑期間請充分補充蛋白質。

儲存：室溫(15-30℃)下保存。

本藥須由醫師處方使用

衛署藥製字第019418號

包裝：6-1000粒鋁箔盒、塑膠瓶裝，2000粒塑膠瓶裝。

PIC/S GMP



杏輝藥品工業股份有限公司

SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.

台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號
84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG-SHAN SHINE, I-LAN, TAIWAN

消費者服務專線：(0800)015151

website：http://www.sinphar.com