

"瑪科隆"佳立鈣錠500毫克

A-Cal Tablets 500mg "MACRO"

衛署藥製字 第 057816 號
醫師藥師藥劑生指示藥品
版本日期 2022-05-06

1 成分

1.1 有效成分及含量

每錠中含Calcium Carbonate 500mg

1.2 其他成分(賦形劑)

Manitol · Prejel · Tartrazine · Sodium saccharine · Milk flavor powder · Magnesium stearate

2 用途(適應症)

緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏的人。

3.1.2 未滿三個月之嬰兒。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 3歲以下。

3.2.2 消化道潰瘍的人。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.3.2 與其他藥品併用時。

3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。

3.4.2 避免陽光直射。

3.4.3 勿超過建議使用量。

3.4.4 一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。

3.4.5 制酸劑之錠劑應嚼碎後吞服。

3.4.6 本藥不得併服其他藥品。

3.4.7 本藥含有碳酸鹽之制酸成分，可能引起腹脹、打嗝。

4 用法用量

一天3至4次，或需要時服用。應嚼碎後吞服。

年齡	使用量
----	-----

12歲以上~成人	每次1錠
6歲以上未滿12歲	每次1/2錠
3歲以上未滿6歲	每次1/4錠
3歲以下之嬰幼兒	請洽醫師診治，不宜自行使用。

5 警語

5.1 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
胃腸道	腹脹、打嗝、噁心、嘔吐、便秘、腹瀉、慢性胃痛、胃部不適或灼熱感
神經系統	頭痛、意識不清、厭食
其他	高血鈣、腎衰竭、鹼中毒

5.2 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 若有任何不適情況產生。

5.2.2 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

6 包裝

6-1000錠PTP鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。

7 儲存方式

貯存於室溫25°C以下，避光。

8 類別

醫師藥師藥劑生指示藥品。

9 作用

中和胃酸，單次劑量(1錠)之酸中和能力為9.0mEq以上。

製造廠

羅得化學製藥股份有限公司

台中市大甲區頂店里8鄰東西七路1段65號

藥商

盛雲藥品股份有限公司

台中市西區忠明南路303號18樓之3