

在使用**易週糖**[®]之前，若您有任何醫療狀況包括以下情況，請告知您的醫療照護提供者：

- 曾經或現正有胰臟、腎臟或肝臟問題

- 有嚴重的胃部問題，例如：您的胃排空速度減緩(胃輕癱)，或有消化食物的問題。

- 已懷孕或計劃懷孕。目前尚不清楚易週糖[®]是否會傷害您的胎兒。若您在使用易週糖[®]時懷孕，請告知您的醫療照護提供者。

- 正在哺乳或計劃哺乳。目前尚不清楚易週糖[®]是否會進入您的乳汁。您和您的醫療照護提供者應決定您在使用易週糖[®]期間是否應該哺乳。

請告知您的醫療照護提供者所有您目前正服用的藥物，包括處方和非處方藥物、維他命以及中草藥補充品。易週糖[®]可能影響有些藥品的作用，而且和有些藥品可能影響易週糖[®]的作用。

使用易週糖[®]前，請與您的醫療照護提供者討論如何辨識低血糖與治療低血糖。請告知您的醫療照護提供者，若您正在使用其他糖尿病藥物，包含胰島素或是Sulfonylureas。

熟知你正在服用的藥物。保有這些藥物清單，當你需要一個新的藥物治療時拿給您的醫療照護提供者和藥師看。

易週糖[®]的使用方式為何？

- 閱讀**易週糖[®]的使用說明**。

- 遵照您的醫療照護提供者指示使用易週糖[®]。

- 初次使用易週糖[®]前，您的醫療照護提供者將指導您如何使用易週糖[®]。

- 易週糖[®]需注射於皮下，例如：胃部(腹部)、大腿或上臂。**請勿**將易週糖[®]注射於肌肉(肌肉注射)或靜脈(靜脈注射)。

- 易週糖[®]於每週的同一天給藥一次，可於一日當中的任何時間給藥。**

- 只要前一劑給予時間超過三天 (包含三天)，則您可以在需要時，更改給藥日期。

- 若您錯過一劑易週糖[®]，且距離下一次預定給藥時間至少 3 日(72 小時)，則應盡快使用。若剩餘不到 3 日，則應忽略錯過的劑量，並於預定日期給予下一次劑量。**請勿**於相隔 3 日內使用 **2** 劑易週糖[®]。

- 易週糖[®]的使用，不須考慮進食與否。

- 請勿**將胰島素與易週糖[®]混合並同時注射。

- 您可能會在身體的同一個部位注射易週糖[®]及胰島素 (例如：您的胃部周圍)，但是請勿彼此相鄰。

- 每週注射時，你的注射部位應改變(輪流)。每次注射時，**請勿**注射於相同的注射部位。

- 請勿與他人共用易週糖[®]注射筆、注射器與針頭**。此行為將會造成互相感染。

您的易週糖[®]劑量與其它糖尿病用藥需依以下情況進行調整：

- 活動量或運動量改變、體重增加或減少、壓力增加、患病程度、飲食改變、或使用其他藥品。

用藥指引 易週糖[®]注射劑 TRULICITY[®] (dulaglutide) 皮下注射用液

在開始使用易週糖[®] (TRULICITY) 前，以及每次拿到新的藥物後，請先閱讀本用藥指引。本文件會不定時增加新資訊。這些資訊僅供參考，關於您的醫療狀況或治療，您仍必須與您的醫療照護提供者洽談。

關於易週糖[®]，我必須知道哪些是最重要的資訊？

易週糖[®]可能會引起的嚴重副作用，包括：

- 可能會導致甲狀腺腫瘤，包括癌症**。若您的頸部有腫塊、或頸部腫脹、聲音嘶啞、吞嚥困難、或呼吸困難，請告知您的醫療照護提供者。這些都可能是甲狀腺癌的症狀。在大鼠或小鼠研究中，易週糖[®]與易週糖[®]作用相似的藥物會導致甲狀腺腫瘤，包含甲狀腺癌。目前尚不清楚易週糖[®]是否會導致人們罹患甲狀腺腫瘤，或罹患一種稱為甲狀腺髓質癌的甲狀腺癌。

- 請勿使用易週糖[®]，若您或您的任何家庭成員曾罹患一種稱為甲狀腺髓質癌(MTC)的甲狀腺癌、或您曾罹患一種稱為第二型多發性內分泌腫瘤症候群(MEN 2)的內分泌疾病症候群。

易週糖[®]是什麼？

易週糖[®]是注射型處方藥，能改善第二型糖尿病成人病患的血糖(葡萄糖)，使用時應配合飲食控制和運動。

- 易週糖[®]不建議作為治療糖尿病的首選藥物。

- 目前尚不清楚易週糖[®]是否可用於曾經罹患胰臟炎的病患。

- 易週糖[®]不可取代胰島素且不適用於罹患第一型糖尿病或罹患糖尿病酮酸血症的病患。

- 易週糖[®]不建議用於有嚴重腸胃問題的病患使用。

- 目前還不清楚易週糖[®]是否能安全有效地使用於 18 歲以下孩童。

請勿使用易週糖[®]，如果：

- 您或任何您的家庭成員曾患有一種稱為甲狀腺髓質癌(MTC)的甲狀腺癌、或您曾罹患一種稱為第二型多發性內分泌腫瘤症候群(MEN 2)的內分泌疾病症候群。

- 您對 dulaglutide 或是易週糖[®]中的任何成分過敏。關於易週糖[®]的完整處方資訊，請參見用藥指引的最末頁。

^aITT 族群。最終觀察值(LOCF)被用於處理缺失值。在投予藥物的救援治療之後的資料被視為缺失值。在第 26 週的主要療效分析，隨機分配至易週糖[®] 0.75 mg、易週糖[®] 1.5 mg 及 glargine 治療組別的缺失值比例分別為 14%、15% 及 14%。

^b依據基礎值、其他分層的因子校正後之最小平方(LS)均值。

[†]納入分析的病患為接受至少一次基準點之後的評估之 ITT 族群的子群體。主要的分析分別包含隨機分佈至易週糖[®] 0.75 mg、易週糖[®] 1.5 mg 及 glargine 組的 275、273 及 276 個個體。

- 16 包裝與儲存**
- 16.1 包裝**
- 易週糖[®]單次劑量注射筆含有紙盒包裝。4 支 1 盒或 2 支 1 盒之單次劑量注射筆 0.75 mg/0.5 mL 溶液於單次劑量注射筆中。1.5 mg/0.5 mL 溶液於單次劑量注射筆中。
- 16.2 儲存**
- 易週糖[®]應該儲存於 2°C 至 8°C (36°F 至 46°F)的冰箱中。請勿使用過期的易週糖[®]。
 - 若有需要，每支單次劑量注射筆可保存於室溫下，不超過 30°C (86°F)，為期至多 14 日。
 - 不可冷凍易週糖[®]。易週糖[®]若遭冷凍後，則不得使用。
 - 易週糖[®]必須避光保存。建議將易週糖[®]置於原紙盒包裝中保存直到需要使用為止。
 - 易週糖[®]單次劑量注射筆必須在使用後，丟棄至尖銳物品保存盒中。

- 17 病患教育資訊**
- 參見核准的用藥指引*
- 應告知病患，易週糖曾造成大鼠發生良性及惡性甲狀腺 C 細胞腫瘤，目前尚未確立此現象與人類的關聯性。應指導病患若出現甲狀腺腫瘤的症狀(例如：頸部腫塊、聲音沙啞、吞嚥困難或呼吸困難)，應告知醫師*[請參閱方框內警語以及警語和注意事項(5.1)]*。
 - 應告知病患，持續嚴重的腹痛，有可能延伸至背部，可能會(或不會)伴隨嘔吐，皆為急性胰臟炎的典型症狀。應指導病患，若發生持續嚴重的腹痛，請立即停用易週糖[®]，並與醫師聯絡*[請參閱警語和注意事項(5.2)]*。
 - 當易週糖[®]與可能會造成低血糖的藥物(例如 sulfonylurea 或胰島素)併用時，低血糖發生的風險可能增加。在病患開始易週糖[®]治療時，尤其是併用 sulfonylurea 或胰島素的病患，請提醒並加強病患對低血糖的教育與處理 *[請參閱警語和注意事項(5.3)]*。
 - 請告知使用易週糖[®]的病患，注意腸胃不良反應而造成脫水的風險，並且應避免體內水分流失。請告知使用易週糖[®]的病患，易週糖[®]可能造成腎功能惡化的潛在風險，並說明腎功能不全的相關徵兆與症狀。若腎衰竭發生，病患可能須接受洗腎的治療。*[請參閱警語和注意事項(5.5)]*。
 - 在上市後報告中指出使用 GLP-1 受體促進劑(GPL-1 receptor agonists)，曾有嚴重過敏反應的案例發生，應告知病患，若發生嚴重過敏反應，應立即停止使用易週糖[®]並尋求醫療協助。*[請參閱警語和注意事項(5.4)]*。
 - 若病患已懷孕或有懷孕計畫，建議婦女應告知他們的醫療照護提供者。*[請參閱特殊族群用藥(8.1)]*。
 - 使用易週糖[®]前，要訓練病患正確的注射技巧，以確保病患得到完整的劑量。請參照隨附之使用說明及圖示指引。*[請參閱用法用量(2.4)]*。
 - 請告知病患關於易週糖[®]的潛在風險和效益及其他的替代治療方式。也應告知病患遵守飲食指引、規律的運動、定期測量血糖及 HbA1c、認識並處理低血糖和高血糖狀況，以及評估糖尿病併發症。在遇到壓力的情況時，如發燒、創傷、感染或是外科手術等，用藥情況可能改變，應建議病患立即尋求醫療協助。
 - 易週糖[®]的每週劑量可在一日當中的任何時間給藥，不須考慮進食與否。若有需要，可以改變每週給藥的日子，但前後兩劑之間的間隔必須為 3 日或 3 日以上。若錯過某次劑量，且距離下次預定劑量至少 3 日(72 小時)，則應儘速給予。之後，病患可恢復其每週一次的用藥時間表。若錯過一劑藥物，且下次預定用藥時間是在 1 日或 2 日之內，病患不可施用錯過的該劑藥物，而應按預定的日期繼續使用下一劑易週糖[®]*[請參閱用法用量(2)]*。
 - 應告知使用易週糖[®]的病患，胃腸道副作用的可能風險*[請參閱不良反應(6.1)]*。
 - 應指導病患於開始接受易週糖[®]治療前及在每次重新處方時，先閱讀藥物指引及使用說明。應指導病患在發生任何異常症狀時，或是有任何已知症狀持續或惡化時，應通知其醫師或藥師。
 - 應告知病患透過定期地測量血糖與 HbA1c，並且以降低這些數值到正常範圍為目標，來監控所有糖尿病治療的反應。HbA1c 對於評估長期血糖控制非常有幫助。

本藥須由醫師處方使用
易週糖[®]注射劑 0.75 mg/0.5 mL 單次劑量注射筆 衛部菌疫輸字第 000979 號
易週糖[®]注射劑 1.5 mg/0.5 mL 單次劑量注射筆 衛部菌疫輸字第 000978 號

製造廠：Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana 46285, USA
包裝廠(美國)：Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana 46285, USA
包裝廠(義大利)：Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731-733, 50019 Sesto Fiorentino (FI), Italy
藥 商：台灣禮來股份有限公司 台北市復興北路 365 號 11 樓

Literature issued Mar29, 2017

易週糖[®]可能的副作用有哪些？

易週糖[®]可能引起的嚴重副作用包括：

- 請見「關於易週糖[®]，我必須知道最重要的資訊是那些？」
- **胰臟發炎(胰臟炎)**。若您的胃部區域(腹部)有持續不止的劇痛，疼痛發生時不一定會伴隨嘔吐，請停用易週糖[®]並立即與您的醫療照護提供者聯絡。您可能會感覺疼痛從腹部蔓延到您的背部。這類疼痛可能是胰臟炎的一種症狀。
- **低血糖(低血糖症)**。若您將易週糖[®]與其他降血糖藥物併用時，例如：Sulfonylurea 或胰島素，可能會增加低血糖發生的風險。

低血糖的徵候與症狀可能包括：

- 頭暈或輕微頭昏眼花
 - 視線模糊
 - 焦慮，易怒或情緒變化
 - 盜汗
 - 說話含糊不清
 - 飢餓
 - 意識不清或嗜睡
 - 顫抖
 - 虛弱
 - 頭痛
 - 心搏快速
 - 感到心神不寧
- **嚴重過敏反應**。若您有任何過敏反應的症狀，例如搔癢、紅疹或呼吸困難，請停止使用易週糖[®]並立即尋求醫療協助。
 - **腎臟問題(腎衰竭)** 若您有腎臟問題、腹瀉、噁心與嘔吐，這些狀況皆會造成身體水份流失(脫水)，且可能造成腎臟問題更加嚴重。
 - **嚴重胃部問題**。其他類似易週糖[®]的藥物會造成嚴重胃部問題。但目前尚不清楚易週糖[®]是否會造成胃部問題或促使胃部問題更加嚴重。

易週糖[®]最常見的副作用包括噁心、腹瀉、嘔吐、食慾不振、消化不良。

諮詢你的醫療照護提供者關於任何困擾你或無法解除的副作用。上述副作用並未包含所有易週糖[®]可能的副作用。

若需更多資訊，請致電詢問您的醫師關於副作用的醫療建議。

有關安全有效使用易週糖[®]的一般資訊

有時會因其他未列於用藥指引的使用目的處方藥物。請勿在未經處方的狀況下使用易週糖[®]。請勿將易週糖[®]提供給他人使用，即使他們與您有相同的症狀。如此可能會對他們造成傷害。

本用藥指引僅摘要出關於易週糖[®]的最重要資訊。若您需要更多資訊，請詢問您的藥師或醫療照護提供者關於易週糖[®]的專業資訊。

易週糖[®]的成分資訊

活性成分：dulaglutide

賦形劑：trisodium citrate dihydrate、citric acid anhydrous、mannitol 與 polysorbate 80

藥商:台灣禮來股份有限公司

台北市復興北路 365 號 11 樓

Literature issued Mar29 2017