



隨著物質生活水準的提高，許多文明病也因應而生，而其中又以血管性疾病對國人構成的威脅最為重大。

一般而言，健康的血管必須具備良好的彈性以維持血流順暢，而一旦血管失去彈性時，則使得血流受到阻礙，無法及時供給各組織充分的氧氣和養分，並導致各種血管病變及症狀產生，例如，在末梢循環方面會出現暈眩、耳鳴、四肢冰冷、麻木感、視力及聽力減退，及間歇性跛行等症狀，此即為末梢血行障礙，而在腦血管方面則可能有記憶力衰退、頭痛、注意力不集中等情形出現，此即為中風之前兆。因此，維持血流通暢及保持血管彈性是防治心臟及血管性疾病的首要之道。

銀之杏膜衣錠係以珍貴銀杏葉(Ginkgo biloba)抽提物所研製而成之純天然植物性血管活化劑，具有改善末梢血管血循作用。

【成 分】每錠中含：

Ginkgo Biloba Extract.....40mg
(eq. to 9.6mg Ginkgoflavonglycosides Calculated as Quercetin, kaempferol and Isohamnetin)

【賦 形 劑】

Lactose、Hydroxypropyl cellulose、Magnesium Stearate、Talc、Crosppovidone XL、Hydroxypropylmethyl cellulose、Polyethylene Glycol 6000、Titanium Dioxide、Brilliant Blue FCF、Tartrazine。

【作 用】

本藥為純植物性萃取成分，藥性溫和、耐受性良好，適用於各種末梢循環障礙之治療。

【適 應 症】

末梢血行障礙。

【用法・用量】

每次一錠，每日服用3次。

本藥須由醫師處方使用。

【禁 忌】

1. 曾對本藥產生過敏反應之患者禁用本藥。
2. 懷孕。

【警語及注意事項】

1. 本藥為天然植物性血管活化劑，殆無毒性及其他明顯之不良反應。

2. 手術出血風險：

如果必須進行手術，請務必告訴醫師正在服用本藥品，並在手術前七天停止使用。

3. 不良反應：

依據案例報告、臨床研究及上市後資料顯示，使用含銀杏葉抽出物成分(Ginkgo biloba extract)之藥品，可能發生以下不良事件，包含器官（如眼睛、鼻子、大腦和胃腸道）出血、頭痛、頭暈、輕微的胃腸道不適（如腹瀉、腹痛、噁心和嘔吐）及過敏性皮膚反應（如紅斑、皮疹、水腫、癢癢），嚴重者甚至可能發生過敏性休克。

【特 殊 族 群】

癲癇病人：

建議癲癇病人避免使用含銀杏葉抽出物成分(Ginkgo biloba extract)及已知會降低癲癇發作閾值之藥品。癲癇病人服用銀杏製劑產品，無法排除該品會促使其下一次癲癇的發作。

【藥品交互作用】

1. Ginkgo biloba與抗凝血劑（如phenprocoumon或warfarin）或抗血小板藥品（如clopidogrel、acetylsalicylic acid及NSAIDs等）併用可能會影響抗凝血劑或抗血小板藥品之作用。

2. Ginkgo biloba與warfarin合併使用時，建議應於開始合併使用、改變劑量、停止或更換使用銀杏製劑時，進行凝血功能監測。

3. Ginkgo biloba可能具有抑制P-glycoprotein作用，而因此增加P-gp受質藥品（如dabigatran）之暴露，建議合併ginkgo biloba與P-gp受質藥品時應謹慎使用。

【孕婦・授乳婦之投與】

本藥品使用於孕婦、授乳婦之安全性尚未確立，因此對孕婦及可能懷孕的婦女與授乳婦在使用之前，宜先權衡治療之必要性方始投與。

【新生兒・乳兒之投與】

由於新生兒及乳兒之組織器官尚未發育完全，宜先權衡治療之必要性方始投與。

【使用後之注意】

本藥服藥後，若發生過敏或不適現象（如發疹、搔癢等），請立即停藥並請教醫師或藥師。

【副 作 用】

本藥耐受性良好，副作用極為罕見。

偶有輕微的胃腸不適、頭痛或皮膚過敏現象發生。

【保 存 上 之 注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。

2. 於25°C以下、避光儲存。

3. 請在有效期限內使用。

【包 裝】

6~1000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2148986