

天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 藥品衛教單

Actein Effervescent Tablet - 600 mg

藥物學名: Acetylcysteine (愛克痰發泡錠)

藥品外觀: 白色圓形發泡錠, 無刻痕, 標記: SYN



掃描看官網資訊

藥品資訊 (Drug Facts)

更新日期: 2026/1/8

用途 (Uses)

此藥品屬於化痰藥, 可減少呼吸道黏膜分泌物的黏性, 已達到化痰的效果。亦可用於治療 acetaminophen(普拿疼)過量。

使用方法 (Directions)

將發泡錠放入杯中, 加入約100 mL的常溫水溶解, 混合均勻後於飲用。

忘記服藥時 (Missed dose):

若忘記服用藥物, 跳過該次未服用的藥品; 請於下次服藥時間服藥, 切記不可一次服用兩倍劑量。

注意事項 (Warnings)

- 發泡錠須加水溶解後飲用, 切勿直接將發泡錠直接吞服或放入舌下含用。
- 發泡錠含有甜味劑阿斯巴甜, 苯酮尿症患者不宜使用。
- 發泡錠帶有硫臭味, 為正常現象, 並非藥品變質, 請您安心服用。
- 為避免影響療效, 不建議將其他藥物與本藥品的溶液混合飲用。
- 此藥品僅能稀釋痰液, 服藥後仍需引用適量開水, 才能達到較佳的化痰效果。

副作用 (Side Effects)

偶爾有不適, 如噁心、嘔吐; 極少數病人會有皮疹的症狀。

保存 (Storage)

室溫下 (25°C) 儲存, 請放置在陰涼、乾燥處, 並置於孩童無法取得之處。完整未拆封的藥品請參考包裝上的有效期限; 藥品拆封後, 請於六個月內使用完畢。

諮詢專線: 新店院區 (02) 2219-3391 #15144 | 安康院區 (02) 2212-3066 #51360

建立日期: 2025/06/06 | © 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院