

特息敏 錠 2毫克

Dex-CTM Tablets 2mg

本品係由 Dexchlorpheniramine Maleate 研製而成之抗組織胺劑，其抗組織胺作用是在作用器細胞上之所有接受器與組織胺競爭，能緩解許多過敏症狀。

[成分] 每錠中含有

Dexchlorpheniramine Maleate.....2mg

[適應症]

緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀（流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢）及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹。

[用法·用量]

一日 3 至 4 次，每次間隔 4 小時以上服用。成人每次 1 錠，12 歲以上適用成人劑量；6 歲以上未滿 12 歲，每次 1/2 錠；3 歲以上未滿 6 歲，每次 1/4 錠；3 歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

[注意事項]

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

[警語]

1. 服用本藥後，可能引起倦怠感、口乾，偶有視覺上之困擾，偶見興奮反應（以幼兒及老年人較常見）。
2. 除非醫師處方，嚴重之代謝性肝腎疾病患者不得服用。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經因本類藥物引起過敏症狀者不得服用。
4. 除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經有心機能障礙、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、腎機能障礙症狀者不得服用。
5. 老年人應小心使用本藥，3 歲以下不建議服用。
6. 如有呼吸之毛病或慢性支氣管炎、青光眼、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難或因前列腺腫大引起之排尿困難患者，請勿服用。
7. 服用本藥不得與酒精性飲料合用。
8. 除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用鎮靜劑或安眠劑等。
9. 服用本藥後，可能引起嗜睡現象，勿駕車或操作危險器械。
10. 連續服用本藥數日後，如果症狀沒有改善，應停藥立即就醫。
11. 不得與其他含有抗組織胺成分或鼻充血解除成分之內服製劑共用（如綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮暈藥、鼻炎藥物或抗過敏藥等）。

[賦形劑]

Lactose monohydrate, Magnesium stearate, Corn starch,
New coccine aluminum lake.

[包裝]

6 ~ 1000 錠塑膠瓶裝及鋁箔盒裝

[儲存條件]

請貯存於 25°C 以下及孩童伸手不及之處。

衛署藥製字第 027040 號

委託者：**健喬信元醫藥生技股份有限公司**

303新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號

製造廠：**優良化學製藥股份有限公司**

303新竹縣湖口鄉中興村光復路10號

SLT1320R-02