

富鐵好嚼錠



衛署藥輸字第016504號

本藥須由醫師處方使用

組成

每一咀嚼錠中含有100毫克以氫氧化三鐵之聚麥芽糖複合物(IPC)型式存在的鐵、環磺酸鹽甘味劑、香料和賦形劑。

性質

藥理作用：抗貧血

富鐵好嚼錠是一種鐵製劑用來治療鐵質缺乏症和缺鐵性貧血。鐵是血色素、肌紅蛋白和含鐵酵素的重要組成。一般而言，鐵缺乏症會導致慢性疲倦、注意力無法集中、易怒、焦急、頭痛、食慾喪失、壓力敏感、易受感染、蒼白、嘴角破裂、皮膚乾燥、脆弱的頭髮和指甲。

富鐵好嚼錠所含的鐵是以氫氧化三鐵之複合物存在，每一個獨立粒子包埋於一種碳水化合物聚合體中(聚麥芽糖)。可以防止鐵對胃腸道系統造成任何傷害，也防止鐵與食物發生交互作用，甚至它也確保了鐵的生體可用率。

IPC的結構與鐵蛋白類似，鐵蛋白是自然存在的貯鐵蛋白。基於這個相似性，富鐵好嚼錠所含的鐵乃經由自然生理的作用機轉進行吸收。IPC也不像亞鐵鹽具易氧化特性。

適應症

預防及治療鐵質缺乏症。缺鐵性貧血。

劑量

本藥須由醫師處方使用。

正常情況，每天一錠，可隨後飲用液體物。此錠也可以和液體物一起吞食，如果需要，劑量可增加為一天服用二次，每次一錠，依據醫生指示，在餐前、餐後或一起服食均可。為補充體內鐵質之庫存，在血質(Hb, Hct, 紅血球)正常後，最好再繼續服用一個月。

持續治療時間：Hb 值為90g/l 或以上時的劑量是每天一錠(100mg)

體重 (Kg)	治療持續時間(週)					
	Hb60 g/l	Hb75 g/l	Hb90 g/l	Hb105 g/l	Hb120 g/l	Hb135 g/l
35	7	6	7	6	5	4
40	8	7	8	7	6	5
45	9	7	8	7	6	5
50	9	8	9	7	6	5
55	10	9	9	8	6	5
60	11	9	10	8	7	5
65	12	10	10	9	7	5
70	12	11	11	9	7	5
75	13	11	11	9	7	6
80	14	12	12	10	8	6
85	15	13	12	10	8	6
90	15	13	13	11	8	6

投予方法

富鐵好嚼錠可以嚼碎或整顆吞服，並且必須在餐中或餐後立刻服用。

禁忌

鐵過度負荷(例如血色素沈著病、血鐵質沈著)或鐵質利用失常(例如鉛中毒性貧血、鐵質利用不良性貧血、地中海型貧血)和非鐵缺乏症引起的貧血(例如溶血性貧血)。

已知對任何相關成分耐受不良。

警語和注意事項

糖尿病病患：每顆咀嚼錠相當於0.03單位麵包。

感染或惡性腫瘤引起的貧血病患：外來替代的鐵會被儲存於內質網系統，只有當原發性疾病痊癒後鐵才會被代謝利用。

交互作用

至今尚未有交互作用報告。因為鐵與複合物結合，所以不會和食物中的組成(植酸鹽、草酸鹽、鞣酸等)及併用藥品(四環黴素、制酸劑)發生離子性交互作用。

檢驗是否有潛血反應的潛血試驗(對血紅素有專一性)，服用富鐵好嚼錠並不會造成影響，因此不需要中斷鐵劑治療。

懷孕和哺乳

動物的生殖試驗未發現對胎兒有害。針對懷孕第一期後婦女進行控制試驗，也未發現任何對母體和胎兒之不良反應。無證據顯示對懷孕第一期會造成危險而且對胎兒也無負面影響。服用富鐵好嚼錠對正在接受哺乳的兒童殆無不良影響。

在懷孕和哺乳期間，服用富鐵好嚼錠前須先徵詢過醫師或藥師之同意。

不良反應

服用富鐵好嚼錠後副作用發生率極低，可能的副作用：便秘、下痢、噁心、腹部疼痛、胃部不適、消化不良、嘔吐、皮疹(蕁麻疹、疹、搔癢)。排黑便是鐵排除所造成的正常現象。富鐵好嚼錠不會著色於牙齒。

過量

至目前為止尚未有中毒或鐵過度負荷的案例。

儲存

25°C 以下保存於原容器。

包裝

每鋁箔片10顆咀嚼錠。

製造廠：

Vifor S. A.

Route de Moncor 10 CH-1752 Villars-Sur-Glane, Switzerland

藥商：居正生技股份有限公司

臺北市中山區中山北路2段79號10樓