

“台灣大塚”

# 補樂益<sup>®</sup> 注射液

Paren-Aid<sup>®</sup> Injection "Otsuka"

“台灣大塚”補樂益 1 號注射液 衛署藥製字第 029455 號

“台灣大塚”補樂益 2 號注射液 衛署藥製字第 029457 號

“台灣大塚”補樂益 3 號注射液 衛署藥製字第 029458 號

本藥限由醫師使用

向來人類經由末梢靜脈輸注只能使用等張之葡萄糖或電解質液，但對無法經口攝食之病患仍無法補充足夠之營養。但自 1967 年 Dudrick 等人發表了經由中心靜脈導管輸注高濃度葡萄糖，使由靜脈補充完全之營養已變成可能。

補樂益 1 號、2 號、3 號乃為提供國內日漸普及之中心靜脈輸注而根據台大醫院外科之處方製成最適合國人之中心靜脈輸注之基劑。含高濃度之葡萄糖及每日需要之維持量的電解質。並預留 200-300mL 之空間以便加入其他氨基酸、維他命等。使國內醫界對於患者之救急、救危更為有利。

[組 成] :mg/mL

成分 品名	NaCl	CH <sub>3</sub> COOK	CH <sub>3</sub> COONa	KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>	MgSO <sub>4</sub> · 7H <sub>2</sub> O	Ca- Gluconate	Glucose
補樂益 1 號	0.234	1.865	1.148	0.680	0.439	1.121	150
補樂益 2 號	1.642	1.717	—	1.701	0.986	—	250
補樂益 3 號	1.642	2.944	—	—	0.986	4.484	250

[電 解 質 量] :

品 名	電解質 mEq/L									Glucose g/L	Cal/L	Osmolality mOsm/L	pH
	Na*	K	Mg	Cl*	Ca	SO <sub>4</sub>	Acetate	Glu- conate	Phosphate m mole/L				
補樂益 1 號	20	24	4	20	5	4	33	5	5	150	600	946	4.0~5.5
補樂益 2 號	30.4	30	8	30.4	—	8	17.5	—	12.5	250	1000	1518	4.0~6.0
補樂益 3 號	30.4	30	8	33	20	8	30	20	—	250	1000	1550	4.5~6.0

(\*含有安定劑 Na<sup>+</sup>及 pH 修正用的 Cl<sup>-</sup>)

[適 應 症] :

補樂益 1 號：小兒病患經口不能攝食時或不能完全攝食之中心靜脈輸注液、小兒電解質熱能補充。

補樂益 2 號：手術前後及未能進食病人之水份、電解質、熱能補充及磷質補充。

補樂益 3 號：手術前後及未能進食病人之水份、電解質、熱能補充及鈣質補充。

[用 法 用 量] :

補樂益 1 號：通常一天 100~200mL/kg，中心靜脈(或未稍)注射或加入 3%Pan-Amin。可依症狀做適宜之增減。

補樂益 2 號：通常一天各 400~1,200 mL，中心靜脈注射，小孩依體重定之。

補樂益 3 號：通常一天各 400~1,200 mL，中心靜脈注射，小孩依體重定之。

[注 意 事 項] :

(1) 取用時：

① 運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動，若發現有上述情形時，請勿使用。

② 本品為無色~淡黃色澄明液，若藥液有不澄清、變色、異物或其他異常現象時，請勿使用。

(2) 輸液套選用及插入法：

① 請依輸液套使用方法正確使用。

② 請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割(Coring)產生碎片。

③ 使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

[包 裝] :

補樂益 1 號：250、300mL 塑膠瓶裝，600、1200、1500mL 塑膠袋裝。

補樂益 2 號：250、400mL 塑膠瓶裝，800-2000mL 塑膠袋裝。

補樂益 3 號：250、400mL 塑膠瓶裝，800-2000mL 塑膠袋裝。

[有 效 期 限]：請見外箱或標籤上之標示。



Otsuka

台灣大塚製藥股份有限公司中壢工廠

桃園縣中壢市吉林路 1 5 號

IP20-2208