

148.5 mm

105 mm

可易適® 泡沫液 VIMAX®

Foaming Solution
(Clobetasol propionate 0.5mg) ①

本劑含0.05% W/W Clobetasol propionate，為一腎上腺皮質類固醇製劑，具有強的抗炎和血管收縮作用，可用於治療牛皮癬(不包括廣泛性的斑狀牛皮癬)，頑強的濕疹、扁平苔癬、盤狀紅斑性狼瘡及其他對較溫和藥效之類固醇無理想反應的皮膚病症。

【成份】每gm含：Clobetasol propionate0.5mg

【賦形劑】Cetyl Alcohol、Stearyl Alcohol、Butylene glycol、Polysorbate 60、Ethanol 95%、Citric Acid Anhydrous、Potassium Citrate、PEG 40、PEG 400、Tea tree essence、Purified Water

【適應症】牛皮癬、濕疹、扁平苔癬、盤狀紅斑性狼瘡。

【用法用量】每日1~2次，輕擦於患部。情況改善後即應停止用藥。治療超過四週後若未再複診則應停止治療。

【注意事項】

- 儘可能避免長期持續治療，尤其是嬰兒及孩童。若使用於孩童，則建議應每週複診。
- 長期大量治療下，臉部通常較其他部位可能發生萎縮性變化。
- 塗敷本劑於眼皮時應小心，避免讓藥物進入眼睛以免可能造成青光眼。
- 使用於牛皮癬的患者須小心注意：可能的危險性包括反激性復發，抗藥性的產生，廣泛的膿疱性牛皮癬以及因皮膚屏障功能受損而引起的局部或全身毒性。
- 若患部發生感染則應使用適當的抗黴菌療法，倘有任何廣泛性的感染應停止使用本劑而服用全身性抗黴菌製劑。
- 封閉包裝會造成溫濕的情況，而促使產生細菌感染。因此包裝之前必須將皮膚清洗乾淨。
- 動物試驗顯示使用局部腎上腺皮質類固醇會有畸胎作用。此發現與人類之關連性尚未建立。但孕婦不得大量或長期使用本劑。
- 發生過敏現象時應立即停藥。

【副作用】

- 長期大量使用於廣泛部位會造成全身性的吸收，產生腎上腺皮質機能亢進現象。尤其是使用在嬰兒、孩童、及封閉包裝情況。
- 長期密集使用會造成皮膚的局部萎縮性變化，如皮膚變薄、產生皺紋及表皮血管的擴張。
- 極少數發現使用腎上腺皮質類固醇(或停藥後)可能會引起病灶產生膿疱。

本藥須由醫師處方使用。

【貯藏】貯存於25°C以下。

【包裝】1000毫升以下鋁罐裝。

衛署藥製字第049063號

委託者：科華生技醫藥股份有限公司

地址：臺北市內湖區民權東路六段180巷6號8樓之11

製造廠：台灣田邊製藥股份有限公司新竹廠

廠址：新竹縣湖口鄉光復北路97號


總經銷商：台田藥品股份有限公司

地址：台北市南港區市民大道七段8號14樓之1

電話：02-2651-8288

慕絲正確操作方式

使用時請握住鋁罐，垂直倒立90度，按下噴嘴即可順利擠出泡沫慕絲



錯誤使用方式

下列錯誤方式會讓瓶內氣體外洩，使用一段時間後就無法擠出慕絲



噴嘴朝上



斜角朝上



水平擠壓

使用泡沫液注意事項

- 本品罐內除了有效成分，還充填了高壓推進氣體，使用時請直接垂直倒立擠出泡沫液即可；勿隨意搖晃！以免過多的氣體混入有效成分中同時被擠出；罐內氣體壓力不足，會導致無法擠出泡沫液。
- 請將泡沫液擠在杯蓋內，再用手指頭挖取適量泡沫液塗抹在患處；為避免藥物過量發生，請不要直接將泡沫液擠在患處使用。
- 請放置於25°C以下陰涼處儲存，不要放在日曬處、浴室、廚房、汽車內等高溫處所。也不可長期放在冰箱，低溫會使內容物油水分離並堵塞噴嘴。
- 當內容物快用完時，擠出的泡沫液就會呈現不完整斷續狀，但罐內仍有殘留的液化氣體，請按壓噴嘴排空氣體，空罐可交由垃圾車回收。



斜角朝下