

“榮民”

葉 酸 錠 5毫克

Folic Acid Tablets 5mg "VPC"

主成份：每錠含：Folic Acid.....5mg
本品含賦形劑Lactose Monohydrate、Potato Starch、Polyvinylpyrrolidone、Sodium Starch Glycolate與Magnesium Stearate。

作用：Folic Acid是保持人體組織正常發育及機能不可缺少的物質，尤其與紅血球的正常形成息息相關，於罹患巨赤芽球性貧血症時，本藥能使網狀紅血球與紅血球成熟，於罹患白血球減少症時，能刺激骨髓而增加白血球。本藥由於Uracil(尿嘧啶)中間體生成Zymin(酵素)等重要的Purine(嘌呤)與Pyrimidine(嘧啶)化合物時具有作為補酵素的作用，Zymin(酵素)會被維他命B₁₂轉變為核酸與核蛋白之要素的Thymidine(三氫胸腺嘧啶脫氧核苷)。據報告指出，缺乏Folic Acid與維他命B₁₂時會阻止骨髓成分之成熟，Folic Acid在肝臟內能促進維他命B₁₂之合成，而維他命B₁₂則能助長葉酸之生成，尤其本藥對於胃腸粘膜的機能具有特殊影響，故對於治療貧血常會併發的舌炎與腹瀉有效。

適應症：惡性貧血、妊娠性貧血、小兒巨大紅血球貧血及骨髓增生或衰退引起之貧血。

用法·用量：成人：起始量1天3次，1次1錠，服用14天或至病情改善，維持量1天1錠，服用1-7天。兒童：起始量1歲以下0.5毫克/每公斤體重，1-5歲每天1錠，6-12歲每天2錠，維持量為起始量之半量。

本藥須由醫師處方使用。

注意事項：1.一般注意事項：惡性貧血患者投與時能改善血液狀態，但對於神經症狀則無效，故惡性貧血患者應與維他命B₁₂製劑併用，且惡性貧血患者於未經診斷確定前投與時，因會改善血液狀態而隱藏惡性貧血以致影響診斷與治療，應請注意。
2.副作用：(A)胃腸：有時會有食慾不振、噁心等症狀。(B)過敏症：有時會有紅斑、搔癢感、全身倦怠感等過敏症狀，如有發生請即停止服用。(C)其他：浮腫，有時會有體重減輕現象發生。

保存條件：本品應包裝於緊密容器，貯於25℃以下，乾燥避光處所。

包裝：2-1000錠玻璃瓶裝、塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

衛署藥製字第007543號



榮民製藥股份有限公司

Taiwan Veterans Pharmaceutical Co., Ltd.

桃園市中壢區中山東路三段447號 Tel:(03)4651190

40411925 ©