

340016-2

Zalain Cream 2% 達來乳膏

 Pantone Red C

 Pantone Black C

Pharmacode: 101



4th Draft
Apr. 05, 2017

Leaflet

尺寸：130 X 210 mm

達來乳膏 Zalain Cream

Sertaconazole Nitrate 2%

衛署藥製字第 043847 號
G-7150

【藥理作用】

Sertaconazole 是一種新的 Imidazole 衍生物製劑供局部外用，對致病酵母菌（如：白色念珠菌、喬比卡利氏念珠菌、環狀皮膚芽胞菌屬念珠菌）、皮癬菌（如：髮癬菌屬、表皮癬菌屬及小芽胞癬菌屬）、與其他可能引起皮膚及黏膜感染之革蘭氏陽性菌（如：葡萄球菌屬與鏈球菌屬）都有效。

【組成】

每公克 Cream 含 Sertaconazole nitrate.....20 mg
賦形劑：Ethylene glycol and polyethyleneglycol palmito stearate (Tefose 63)、Polyoxyethylenated and glycolized saturated glycerides C10-C18 (Labrafil M-2130 CS)、Glycerol mono and di-isostearate (Isostearic Peceol)、Vaseline oil、Methyl p-hydroxybenzoate (Nipagin)、Sorbic acid、Distilled water

適應症

治療皮膚表面黴菌感染，例如：足癬、股癬、圓癬、髮癬、手癬、念珠菌、變色糠疹。

用法用量

每天使用乳膏 1 或 2 次（最好是晚上或早、晚各使用一次），均勻塗抹本藥物於含患部外 1 公分處。使傷口修復所需之療程因人而異，也與致病菌和感染部位有關。一般而言，完整療程是四週，不會再有復發情形發生。然而，大部分患者在治療 2-4 週期間，就已有臨床修復現象出現。

配伍禁忌 未知

注意事項 Zalain 乳膏不可用於眼部治療

交互作用 無藥物間交互作用報告

副作用

局部治療之安全性絕佳，無毒性或光敏感性現象發生。只有極少數病例在第一次治療前幾天，有瞬間輕微紅腫之局部反應報告，此種現象並不需要停藥。

懷孕時使用

當大劑量局部使用時，血漿中仍未被偵測，雖然對懷孕婦女可能不會造成危害，但對懷孕或授乳中婦女若要使用本藥品，仍應仔細評估其利益得失。

過量治療

就有效成分濃度及投與途徑而言，藥物中毒是不可能發生的。若意外服用，應以適當方式做症狀治療。

【包裝】

1000 公克以下鋁管裝
藥品應置於 25°C 以下陰涼乾燥處，避免陽光直射及兒童不易取得之處。
本藥須由醫師處方使用

【藥商】科進製藥科技股份有限公司

【公司地址】台北市南港區 (115) 園區街 3 號 14 樓之 7

【藥廠地址】新竹縣竹北市生醫路 2 段 22、26 號 4 樓


【經銷藥商】科懋生物科技股份有限公司

【電話】(02)2655-7568

【技術授權】西班牙 Ferrer 大藥廠

340016-2

材質：60P模造紙 / 折法：直式平行3摺 / 完成尺寸：(W)13 x (H)2.7cm ± 0.1



科進 Approved by: _____

RA Approved by: _____

Date: _____