

天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 藥品衛教單

Strocain Tablet - 5/ 244 mg

藥物學名: Oxethazaine, Polymigel (息痛佳音錠)

藥品外觀: 白色微帶褐色的錠劑, 標記: EISA/ SR005



掃描看官網資訊

藥品資訊 (Drug Facts)

更新日期: 2026/1/8

用途 (Uses)

此藥為制酸劑複方, 可減少胃酸及緩解急性胃痛症狀。

使用方法 (Directions)

可於飯前或者飯後服用, 服藥時搭配適量白開水; 藥品須整粒吞服, 不可剝半、磨粉。

忘記服藥時 (Missed dose):

若發現忘記吃藥的時間, 尚未超過下一次服藥時間的一半, 請補吃藥物; 若已超過時間則略過該次服藥, 於下次服藥時間服用。

注意事項 (Warnings)

- 不建議長期連續使用此藥, 若服用一段時間後仍症狀持續, 請回診讓醫師重新評估。
- 本藥不可咬碎或咀嚼, 咬碎後其成分會造成口腔麻木, 導致吞嚥困難。
- 孕婦、兒童或腎功能不良者, 應在醫師指示下審慎使用。

副作用 (Side Effects)

便秘、噁心、口渴、腹瀉、頭痛、暈眩、嗜睡或虛弱。

保存 (Storage)

室溫下 (30°C) 儲存。藥品未拆封請參考包裝上有效期限; 拆封後請於6個月內使用完畢, 並將藥品放置在陰涼、乾燥處。

諮詢專線: 新店院區 (02) 2219-3391 #15144 | 安康院區 (02) 2212-3066 #51360

建立日期: 2025/06/16 | © 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院