

“應元” 視益眼藥水 0.25%

Showen eye drops 0.25% “Y.Y.”

本品是脂溶性，能擴散通過細菌胞膜，和細菌核糖體的 50 S 次單位結合，改變胺基酸，形成肽鏈，因此抑制肽鏈和蛋白質的合成。局部眼睛治療後，在眼內些微吸收產生及局部眼睛治療後，在房水內可能測到氯黴素存在，乃為其藥理作用。

【成分】 Each ml contains :

Chloramphenicol.....2.5mg (potency)

賦形劑：

Thimerosal , Sodium Borate Decahydrate , Water for Injection ,

Polyethylene Glycol 400 , Sodium Chloride , Boric Acid 。

【適應症】

沙眼、鏈球菌、葡萄球菌、肺炎雙球菌、大腸桿菌等所引起之疾患。

【用法用量】

每間隔 1~4 小時點 1 滴。

本藥須由醫師處方使用

【注意事項】

1. 氯黴素眼藥水，雖然不會引起再生不良性貧血，但長時間使用，可能會有影響，因此有些藥學專家建議，使用其他抗生素，但也肯定氯黴素的治療價值，因為其脂溶性佳，而且具優越角膜穿透力。和其他使用在眼睛的抗生素例如 Neomycin 相比較下，氯黴素的毒性反應還是低很多。
2. 未曾有任何醫學上證據顯示對孕婦、產婦及授乳婦有影響，但還是要小心給藥。
3. 療程必須盡力完成，若忘記使用儘快補回，但卻不要提早使用在接近下一次給藥時間前。
4. 投與本品數天後，若情況未見改善，請告訴你的醫生。

【副作用】

很長時間使用本品可能會有下列症狀產生，但機會非常少；皮膚蒼白、喉嚨發炎、發燒、不尋常出血、瘀血、疲倦或虛弱。若有以上症狀產生時，只要停止給藥，即可恢復。

【貯存】

緊密容器中，於 25°C 儲存，避免光線直射。貯存在小孩子拿不到的地方。

有效期間內使用，若已超過有效期間，請勿使用。

【包裝】

100 公撮以下瓶裝。

**應元化學製藥股份有限公司**

台灣台南市安平工業區新忠路 26 號 TEL : (06) 2654883 (代表號)