

外盒、仿單、標籤粘貼表

產品名稱	益痔康軟膏	申請廠商	育新企業有限公司
衛生署給證號碼	衛署藥製 字第 042844 號		



衛署藥製字第 042844 號
G-6590

益痔康 軟膏

alcos-anal[®] ointment

益痔康 (alcos-anal[®]) 刺激衰退結締組織的新生，使痔核壁產生新的結締組織。這些新組織日漸收縮，使痔核日漸縮小，最後僅殘留一小形隆起之厚皮，痔瘡即形治癒。至於肛門之搔癢及濕疹。在應用益痔康短時間內即可消失。

【適應症】痔瘡

【用法】外痔：以溫水洗淨肛門，以軟紙拭乾，再塗佈益痔康軟膏。於夜晚使用時，在塗佈藥膏後，如能覆以軟布，則效力更佳。

內痔：油膏：軟膏管上套以使用器，為使插入肛門便利，宜先塗些軟膏於使用器上，再行儘量插入肛門，輕壓軟膏管，同時緩慢拉出使用器，軟膏遂均勻塗佈於內痔患處。將使用器清潔後備下次使用。

本藥須由醫師處方使用

- 【注意】
1. 益痔康之有效成分能迅速擴佈於粘膜表面及皺褶處並發生治療作用。通常短時間內疼痛即可消失，流血亦可停止，此即所謂症狀治療。
 2. 即使症狀消失後，仍須繼續用藥數星期，以求根治。而防復發。根治之方法，最好於早晨、夜晚及便後各用藥一次。因為內痔與外痔常連帶發生，栓劑與軟膏如能同時使用，效力更佳。通常根治之時間約需 6 ~ 8 星期左右。
 3. 初用藥時常有灼熱感覺，此即開始發生療效的現象。此種現象在用藥兩三日後即消失。
 4. 便秘及堅硬之大便對痔瘡之治療常有很大的妨害，患者應養成每日大便的習慣，並保持大便的暢通。
 5. 注意保持肛門之清潔，並使用軟質衛生紙。

【成分】每公克含：
Sodium Oleate 100mg

【包裝】1000克以下軟管裝

【賦形劑】Polidocanol、Chlorocarcavacol、Oleyl Oleate、Carboxymethylcellulose Sodium、Propylene Glycol、Sodium Hydroxide、Lanolin Anhydrous、Glyceryl Monostearate、Oxynex、Vaselin、Perfume、Purified Water

委託者：育新企業有限公司
桃園市龜山區大湖里文三一街37號
製造廠：明德製藥股份有限公司
桃園市楊梅區民富路二段360號
MADE IN TAIWAN