

“景德” 感冒寧 膠囊

C.A.P. Capsules “Kingdom”

【成分名】

Acetaminophen
Ethoxybenzamide
Chlorpheniramine Maleate
Methyl Ephedrine HCl
Caffeine Anhydrous

【劑型、含量】

膠囊劑：每粒含 Acetaminophen 150.0 mg
Ethoxybenzamide 150.0 mg
Chlorpheniramine Maleate 4.0 mg
Methyl Ephedrine HCl 15.0 mg
Caffeine Anhydrous 30.0 mg

【適應症】

緩解感冒之各種症狀（咳嗽、咯痰、咽喉痛、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛、流鼻水、鼻塞、打噴嚏）。

【用法用量】

醫師藥師藥劑生指示藥品。
每日三次，成人每次一粒。
12歲以上，適用成人劑量。
9歲以上未滿12歲，每次 1/2 粒。
6歲以上未滿9歲，每次 1/4 粒。
6歲以下之兒童，請洽醫師診治，不宜自行使用。

【注意事項】

- 1.為防止兒童誤食請妥善保管。
- 2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 3.除非有醫師藥師藥劑生指示，請注意下列事項：
 - (1)孕婦及授乳婦不建議自行使用。
 - (2)服用本藥時不得併服其他藥品。
- 4.勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
- 5.不得併服含酒精飲料。

【警語】

- 1.服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴、喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊等症狀時，應停藥立即就醫。
- 2.除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
 - (1)6歲以下不建議自行使用。
 - (2)曾經因本藥引起過敏症狀者不得使用。
- 3.患有肝、腎疾病或其他重大疾病之患者，服用本藥前，應先請教醫師藥師藥劑生。
- 4.除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併服其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鼻炎藥物或抗過敏藥及解熱鎮痛藥物。
- 5.若咳嗽持續達一星期以上，或若有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛，應停藥立即就醫。
- 6.吸菸、慢性阻塞性肺疾病(患)，如氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽患者，請勿自行使用本藥。
- 7.不要服用超過建議劑量，因高劑量會產生焦慮、暈眩或失眠、兒童可能會產生躁動。
- 8.不要服用本藥超過七日。
- 9.服用本藥後，如果症狀沒有改善、或症狀併隨有發燒、或發燒持續三日，應停藥立即就醫。
- 10.服用本藥後，如果喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐，應停藥立即就醫。
- 11.酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為Acetaminophen、Ethoxybenzamide可能造成肝損害及胃出血。
- 12.本藥含抗組織胺類成分，應注意下列事項：
 - (1)服用本藥後，可能引起嗜睡現象，駕車或操作危險器械時要小心。不要合併飲用含酒精之飲料，亦不要服用安眠藥、鎮靜劑之類的藥品。

- (2)除非有醫師藥師藥劑生指示，下列病患請勿服用本藥：青光眼、肺氣腫、呼吸急促、或呼吸困難、因前列腺腫大引起之排尿困難等。
- 13.本藥含有支氣管擴張成分，除非有醫師藥師藥劑生指示，有心臟病或高齡者不得服用本藥。
- 14.本藥含咖啡因類成分，應限制再服用含咖啡因藥品、飲料（如：茶、咖啡、可樂等），過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速，為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。12歲以下兒童不建議使用。
- 15.肝毒性：
 - (1)使用acetaminophen(paracetamol)曾有發生急性肝衰竭的案例，並可能導致肝臟移植及死亡。大部份發生肝臟損害之病例係因使用超過每日4,000毫克的acetaminophen所致，且多涉及使用超過一種以上含acetaminophen成分之藥品。
 - (2)過量服用acetaminophen可能是因想要獲得更大的疼痛緩解效果，或是在不知道的情況下同時使用了其他同樣含有acetaminophen成分之藥品，因而造成用藥過量。
 - (3)有潛在肝臟疾病的病人，以及於使用acetaminophen期間喝酒者，有較高發生急性肝衰竭的風險。醫療人員應囑咐病人，病人亦應注意藥品的標示中是否含有acetaminophen或paracetamol成分，不可同時使用超過一種以上含有acetaminophen成分之藥品。如果一天誤服超過4,000毫克的acetaminophen，即使並未感覺不適，也應立即就醫。
- 16.與酒精併用：不得併服含酒精飲料，因為acetaminophen可能造成肝損害。慢性重度酒精濫用者亦可能會因過度使用acetaminophen而增加肝毒性危險，本品不應與酒精併用。
- 17.過量：
 - (1)服用過量acetaminophen會在服藥24小時內看到初期症狀，可能包括：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、不適、蒼白及出汗。
 - (2)本品單次或多次過量使用有潛在的藥物成癮或濫用之可能，情況允許下，建議諮詢適當的專家。
 - (3)Acetaminophen過量最嚴重之不良反應為致命性之肝臟壞死。亦可能發生腎小管壞死，低血糖昏迷以及凝血異常之不良反應。用藥過量之肝毒性早期症狀可能包括：噁心，嘔吐，出汗和全身不適。肝毒性的臨床及實驗室證據可能要等到攝入後48~72小時才明顯可見。
- 18.過敏/過敏性反應：上市後曾有發生與使用acetaminophen相關之過敏及過敏性反應的報告。臨床表徵包括臉、口及喉嚨腫脹、呼吸窘迫、蕁麻疹、皮疹、搔癢以及嘔吐。偶有發生危及生命並須緊急送醫治療之過敏性反應的案例。醫療人員應提醒病人，如果發生這些症狀，應立即停藥並就醫治療。曾對acetaminophen過敏的病人，亦應主動告知醫療人員，切勿使用含該成分之藥品。
- 19.嚴重皮膚反應：使用acetaminophen的病人中，曾有少數發生嚴重且可能致命之皮膚反應的報告，如急性全身發疹性膿疱病（Acute Generalized Exanthematous Pustulosis, AGEP）、史蒂文斯-強生症候群（Stevens-Johnson Syndrome, SJS）和毒性表皮壞死溶解症（Toxic Epidermal Necrolysis, TEN）。病人應瞭解並被告知嚴重皮膚反應的症狀，以及出現皮疹或其他過敏症狀時，應停止使用本藥。

【貯存】

本品於低溫下緊密避光容器貯存。

【包裝】

6~1000粒塑膠瓶裝。

衛署藥製字第032124號
G-1570

委託者：SK景德製藥股份有限公司
地 址：台北市中山區中山北路二段113號8樓
製造者：盈盈生技製藥股份有限公司三峽廠
廠 址：新北市三峽區紫新路26巷6號