



非類固醇、非比林系、消炎、鎮痛劑

FUO-006 外用  
衛署藥製字第043214號

1.82cm

伏加斯®



(匹洛西卡)

Focus®

Gel 10mg/gm

(Piroxicam)

本藥主成分Piroxicam具有Prostaglandin抑制作用，可迅速緩解患處之紅腫熱痛，於各科領域之臨床應用上具有相當優異的治療成效。

【成分】每公克中含：

Piroxicam.....10mg

【賦形劑】

Propylene Glycol、Triethanolamine、Polyethyleneglycol 400、Carboxypolymethylene 940、Isopropyl Alcohol、L-Menthol、Purified Water。

【作用】

1. 本藥可藉由抑制前列腺素合成酶（Cyclooxygenase）的作用，而阻斷前列腺素（Prostaglandin）之合成與作用，故可產生優異之消炎、鎮痛的效果。
2. 本藥為外用之消炎止痛劑，其含有1%之Piroxicam，同時由於本藥含水溶性揮發性基劑，故具有迅速止痛及清涼的效果，且使用時不會產生油膩感。

【適應症】

類風濕性關節炎、骨關節炎（關節痛、退化性關節炎）、僵直性脊椎炎、急性肌肉骨骼損傷和急性痛風、肌肉痛、外傷後之腫脹及疼痛。

【用法·用量】

一天數次，取適量塗抹於患處並輕輕按摩擦入。  
本藥須由醫師處方使用。

【禁忌症】

曾對本藥產生過敏反應之患者禁用本藥。

【一般注意】

1. 本藥只可使用於完整之皮膚表面，不可使用於創傷、刀傷等之暴露性傷口表面。
2. 本藥不可用於皮膚感染症及化膿性皮膚炎的治療。
3. 2歲以下兒童之使用須詢問醫師或藥師。

【孕婦、授乳婦之投與】

本藥品使用於孕婦、授乳婦之安全性尚未確立，因此對孕婦及可能懷孕的婦女與授乳婦在使用之前，宜先權衡治療之必要性方始投與。

【新生兒、乳兒之投與】

由於新生兒及乳兒之組織器官尚未發育完全，宜先權衡治療之必要性方始投與。

【使用後之注意】

本藥使用後，若發生過敏或不適現象（如發疹、搔癢等），請立即停藥並請教醫師或藥師。

【副作用】

本藥耐受性良好，偶有搔癢、灼熱感、局部發紅、過敏性皮膚炎等現象。

【保存上之注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 陰涼處儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【包裝】

1000gm以下鋁軟管裝、塑膠軟管裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2150433