

COVID-19 AZ疫苗接種前注意事項

A. 本次接種的疫苗廠牌？

AstraZeneca COVID-19疫苗 (簡稱AZ 疫苗)

B. 哪些人不能接種AZ疫苗？

1. 對疫苗過敏者
2. 18歲以下青少年
3. 孕婦，目前缺乏安全證據，暫不建議施打。

C. 哪些人考慮暫緩接種AZ疫苗？

4. 正在發燒或有急性疾病者--待病情穩定後再接種。
5. 服用避孕藥與接受荷爾蒙治療者--應停藥28天後再接種。
6. 短期內曾接種其他疫苗者--不活化疫苗(流感、肺炎鏈球菌、B肝...)間隔至少14天，活性減毒疫苗(MMR、水痘...)間隔至少28天。

COVID-19 疫苗接種當下可能發生什麼問題？

接種後30分鐘內可能發生的反應 (皆不常見)，該如何處理？

接種後應於注射室附近稍做休息並**觀察至少30分鐘**，無恙後再離開，若有不適請盡快告知醫護人員；

迷走神經反應 (暈針)。

立即型嚴重過敏反應 (罕見)：症狀包含呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等。

如有使用抗血小板、抗凝血藥物，或凝血功能異常者，施打後應於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否有出血或血腫情形。

接種後可能發生的副作用有哪些，該如何處理？

A. 接種2天內發燒

建議多喝水，多休息，可服用醫師開立之退燒藥。若持續發燒或有其他不適，可就醫並告知醫師相關症狀、發生時間與疫苗接種時間，以作為診斷參考

B. 接種2天後仍持續發燒應盡速至急診就醫，並告知醫師曾接種疫苗

1. 接種部位疼痛、頭痛、疲倦、肌肉痛、關節痛通常輕微並於數天內消失，當症狀持續未改善者，應儘速就醫診治
2. 嚴重過敏反應 (如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速)接種後於休息區稍做休息，並觀察至少30分鐘，無恙後再離開，注射室備有急救設備可即時處理發生率極低的立即型嚴重過敏反應
3. 血栓併血小板低下事件 (非常罕見)接種疫苗後14天內，若有呼吸困難、胸痛、持續腹痛、四肢腫脹或冰冷、持續嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊或皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等症狀，應立即至急診就醫

C. 接種完COVID-19疫苗之後我可以接種其他疫苗嗎？

COVID-19疫苗不建議與其他疫苗同時接種，目前建議先完成完整兩劑疫苗接種後，再接種其他疫苗，等待施打第二劑期間也不建議施打其他疫苗。完成第二劑COVID-19疫苗之後至少間隔14天才可接種其他非活性疫苗，至少28天可接種其他活性減毒疫苗。

D. 疫苗**保護力並非100%**，接種疫苗後，仍有少數機會會罹患COVID-19。

因此即使完成COVID-19疫苗接種，仍應遵守防疫新生活原則，勤洗手、佩戴口罩、保持社交距離，以降低感染風險。